

СТАНОВИЩЕ

Използваме Полимакс при едновременна лъчехимиотерапия при големите тумори убийци- недребноклетъчен рак на белия дроб в III и IV четвърти стадии, и при рак на маточната шийка с метастази в тазовите лимфни възли. И при двата тумора едновременното приложение на ежедневна радиотерапия и ежеседмична химиотерапия с един или два от изброените медикаменти - паклитаксел, карбоплатина или цисплатина е спасителен лечебен метод на избор, но с повече нежелани ранни лъчеви реакции. Прилагаме препарата по време на лъчелечебния курс- при първа изява на хематологична токсичност и до 2 месеца след завършване на терапията. Препарата е с отлична поносимост, без отчетени странични ефекти. Пациентите съобщават, че се чувстват по-бодри и имат подобрен апетит. Натрупан е богат опит - препарата се използва вече 40 години в света, а при нас от около 10 години, като подпомагащ основната терапия в лечението на злокачествените тумори за подобряване качеството на живот, стабилизиращ имунната система и подпомагащ по-лесната поносимост на тежката едновременна лъчехимиотерапия. При тези болни беше приложена терапия с Полимакс 100 табл. или Полимакс Плюс – 90 табл и 15 меки желатинови капсули, в доза 3x1т. дневно самостоятелно или в комбинация с капсули по 1 през ден с продължителност поне на два месеца след приключване на лечението.

В заключение може да се каже, че Полимакс Плюс има свое място в терапевтичния режим на болни, провеждащи химио- и лъчетерапия. Имуонтерапията с Полимакс е удобна за пациентите, няма странични ефекти и позволява провеждането на планираните курсове химио- и лъчетерапия.

Дата: 01.11.2019

Град: София

Д-р Стоянка Георгиева
д-р Месут Мехмед

