

СТАНОВИЩЕ
от д-р К. П. Костов

Относно приложение на продукта Полимакс Екстра Плюс

Полимакс Екстра Плюс е немски продукт за имунотерапия на основата на екстракт от свинска слезка и съдържа имуногенни олиго- и полипептиди. Продукта традиционно се прилага по време или след химиотерапия при пациенти с онкологични заболявания, за поддържане на оптимално ниво на имунологичните показатели.

Продукта Полимакс Екстра Плюс е прилаган в орделение по Химиотерапия в продължение на 30 дни през месец Ноември 2016 г.

Наблюдавани са 4ма пациенти с различни злокачествени заболявания в напреднал или метастазиран стадии, провеждащи химиотерапия.

При всички болни като ефект от приложената химиотерапия е наблюдавана левкопения в лека или средна степен по скалата на СЗО.

При тези болни беше приложена терапия с Полимакс Екстра Плюс – 30 табл и 15 меки желатинови капсули, в доза 3x1т. дневно, в комбинация с капсули по 1 или 2 на ден в продължение на десет дена.

В резултат на приложената терапия се наблюдава възстановяване на стойностите на левкоцитите до норма само след десет дневен прием, което ни позволи да продължим планираната цитостатична терапия. Спиране на химиотерапията не се наложи при нито един болен. Не се наблюдаваха значими странични ефекти.

Кръвните показатели бяха изследвани преди прилагане на химиотерапия, след химиотерапия и след десет дневна терапия с Полимакс Екстра Плюс.

От наблюдаваните показатели преди химиотерапия левкоцитите, лимфоцитите и тромбоцитите са в рамките на долните граници на референтните стойности. След химиотерапията се наблюдава очакван спад в стойностите, но прави впечатление, че след десет дневен прием на Полимакс Екстра Плюс има значително повишаване в стойностите на левкоцитите, лимфоцитите и тромбоцитите при всички изследвани пациенти.

При предварителните изследвания на периферна кръв изхоните стойности на левкоцитите бяха между $2,8 - 4,7 \cdot 10^9/L$. След химиотерапия се наблюдава спад в рамките на $2,2-3,3 \cdot 10^9/L$. След десетдневен прием на Полимакс Екстра Плюс лимфоцитите се повишават до $4,4 - 6,8 \cdot 10^9/L$.

Същите наблюдения имахме и върху лимфоцитите – предварителни: $1,00 - 1,85 \cdot 10^9/L$; след химиотерапия: $0,7 - 1,85 \cdot 10^9/L$; след Полимакс Екстра Плюс: $1-2,4 \cdot 10^9/L$.

Наблюдавахме подобна тенденция и при тромбоцитите – предварителни: $129 - 261 \cdot 10^9/L$; след химиотерапия: $41 - 194 \cdot 10^9/L$; след Полимакс Екстра Плюс – $200 - 649 \cdot 10^9/L$;

Като цяло считаме, че Полимакс Екстра Плюс има изразен левкостимулиращ ефект по време и след завършване на химиотерапия. Това позволява провеждането на основното лечение, без

да се налага спирането му, поради спаднали под нормата кръвни показатели. В случаите с много ниски нива на показателите, възстановяването им след Полимакс Екстра Плюс е значимо и бързо.

В допълнение към левкостимулиращия ефект, пациентите съобщават, че се чувстват по-бодри, с подобreno самочувствие и апетит.

В заключение може да се каже, че Полимакс Екстра Плюс има свое място в терапевтичния режим на третиране на левкопения при болни, провеждащи химиотерпия. Имунотерапията с Полимакс е удобна за пациентите, няма странични ефекти и позволява провеждането на планираните курсове химиотерапия.

Дата: 15.03.2017

Град: София

Име, Подпись, Печат

Д-р Кримаки Кримак

